

- نقول إن الحدين  $A$  و  $B$  غير منسجمين إذا كان فقط إذا كان  $A \cap B = \emptyset$ .

## (II) الفضاءات الاحتمالية المنتهية:

### 1- مثال:

نرمي نردا مكعباً وجوهه الستة مرقمة من 1 إلى 6. كون الإمكانيات:  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

- لدينا حظ واحد على 6 للحصول على الرقم 1.

نقول إن احتمال الحصول على 1 هو  $\frac{1}{6}$  أو احتمال الحدث  $A$

$$\text{الحصول على 1} \text{ هو } p(A) = \frac{1}{6}$$

- احتمال الأحداث الابتدائية هو:

$$i \in \{1, 2, 3, \dots, 6\}; p(\{i\}) = \frac{1}{6}$$

### 2- تعريف:

نعتبر المجموعة:  $\Omega = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  (كون الإمكانيات)

نقول إننا قد عرفنا احتمالاً  $p$  على  $\Omega$  إذا ربطنا كل عنصر

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1 \text{ و } 0 \leq p_i \leq 1$$

$$\text{ونكتب: } p(a_i) = p_i$$

- الزوج  $(\Omega, p)$  يسمى فضاء احتمالياً ممتداً.

### 3- احتمال حدث:

ليكن  $(\Omega, p)$  فضاء احتمالياً ممتداً ولتكن  $A$  حدثاً.

احتمال الحدث  $A$  هو مجموع احتمالات الأحداث الابتدائية التي تكونه.

يعني: إذا كان:  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

$$p(A) = p(a_1) + p(a_2) + \dots + p(a_n)$$

### ملاحظة:

ليكن  $(\Omega, p)$  فضاء احتمالياً ممتداً.

- ليكن  $A$  حدثاً. لدينا  $0 \leq p(A) \leq 1$ .

$$p(\emptyset) = 0$$

$$p(\Omega) = 1$$

### أمثلة:

**مثال 1:** نعتبر  $\Omega = \{P, F\}$

- نعتبر الاحتمال  $p_1$  المعرف بما يلي:

$$p_1(F) = \frac{1}{2}, p_1(P) = \frac{1}{2}$$

- نعتبر الاحتمال  $p_2$  المعرف بما يلي:

$$p_2(F) = \frac{1}{3}, p_2(P) = \frac{2}{3}$$

## (I) الوضعيات العشوائية:

### 1- تعريف:

- إذا رمي لنا قطعة نقود في الهواء فإننا لا نعلم مسبقاً هل ستتعين وجهها أم ظهرها.

- إذا رمي لنا نرداً مكعباً فإننا لا نعلم مسبقاً الرقم الذي سيعينه.

- إن مثل هذه الوضعيات تسمى وضعيات عشوائية.

### 2- أمثلة:

#### مثال (1):

نرمي قطعة نقود في الفضاء. هناك حالتان: إما أن نحصل على  $P$  أو  $F$ .

المجموعة:  $\Omega = \{P, F\}$  المكونة من جميع الإمكانيات تسمى كون الإمكانيات. وكل عنصر من  $\Omega$  يسمى إمكانية.

#### مثال (2):

صندوق يحتوي على 4 كرات تحمل الأرقام 1، 2، 3، 4 نسحب عشوائياً وفي أن واحد كرتين من الصندوق.

- ليكن  $\Omega$  كون الإمكانيات:

لتكن  $U = \{1, 2, 3, 4\}$  المجموعة المكونة من الكرات.

كل إمكانية هي عبارة عن تأليف لعنصرين من بين 4 عناصر المجموعة  $U$ . إذن:

$$\text{card}\Omega = C_4^2 = \frac{4 \cdot 3}{2 \cdot 1} = 6$$

ولدينا:

$$\Omega = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 4\}, \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{3, 4\}\}$$

الإمكانية  $\{2, 3\}$  تحقق الحدث: "الحصول على كرتين مجموعهما يساوي 5".

والإمكانية  $\{1, 4\}$  كذلك.

المجموعة:  $\{1, 4\}, \{2, 3\}$  تسمى حدثاً.

ونقول: ليكن  $A$  الحدث: "الحصول على مجموع يساوي 5".

### 3- مصطلحات:

نربط كل وضعية عشوائية بالمجموعة  $\Omega$  المكونة من جميع الحالات الممكنة.

-  $\Omega$  تسمى كون الإمكانيات.

- كل عنصر من  $\Omega$  يسمى إمكانية.

- كل جزء  $A$  من  $\Omega$  يسمى حدثاً. وبالتالي ستكون  $P(\Omega)$  هي مجموعة الأحداث.

- الحدث  $\emptyset$  يسمى الحدث المستحيل.

- الحدث  $\Omega$  يسمى الحدث الأكيد.

- الأحداث المكونة من إمكانية تسمى الأحداث الابتدائية.

- ليكن  $A$  و  $B$  حدثين.

- الحدث  $A \cap B$  يسمى الحدث  $A$  و  $B$ .

- الحدث  $A \cup B$  يسمى الحدث  $A$  أو  $B$ .

## تمرين:

نرمي نردا وجوهه مرقمة من 1 إلى 6 ومحشوش.

بحيث الوجوه التي تحمل رقما زوجيا لها نفس الاحتمال.

والوجوه التي تحمل رقما فرديا لها نفس الاحتمال.

واحتمال الحصول على رقم زوجي يضاعف احتمال الحصول على رقم فردي.

لدينا:  $a_i \neq b_j$  إذن  $A \cap B = \emptyset$

$$A \cup B = \{a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n\}$$

إذن

$$p(A \cup B) = p(a_1) + \dots + p(a_n) + p(b_1) + \dots + p(b_n)$$

$$= p(A) + p(B)$$

### ملاحظة:

- لتكن  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$  احداثاً منفصلة متشابهة.

$$\forall i \neq j \quad A_i \cap A_j = \emptyset$$

$$p\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n p(A_i)$$

### خاصية (2):

ليكن  $A$  و  $B$  حدثين.

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

### برهان:

$$A \cup B = A \cup (B - A)$$

$$A \cap (B - A) = \emptyset$$

$$p(A \cup B) = p(A \cup (B - A))$$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B - A)$$

ولدينا:

$$B = (A \cap B) \cap (B - A)$$

$$(A \cap B) \cap (B - A) = \emptyset$$

$$p(B) = p((A \cap B) \cup (B - A))$$

$$= p(A \cap B) + p(B - A)$$

$$p(B - A) = p(B) - p(A \cap B)$$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B)$$

### خاصية (3):

ليكن  $A$  حدثاً و  $\bar{A}$  الحدث المضاد لـ  $A$ .

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A)$$

### برهان:

$$A \cap \bar{A} = \emptyset \quad \text{و} \quad \bar{A} = \Omega$$

$$p(A \cup \bar{A}) = p(\Omega)$$

$$p(A) + p(\bar{A}) = 1$$

$$p(\bar{A}) = 1 - p(A)$$

### خاصية (4):

ليكن  $A$  و  $B$  حدثين.

$$p(A) \leq p(B)$$

إذا كان  $A \subset B$  فإن

### برهان:

نضع  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

و  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$

$$A \cap B = \emptyset \quad \text{حيث} \quad A \text{ و} \quad B \text{ حدثين}$$

$$p(A \cup B) = p(A) + p(B)$$

### خاصية (1):

## 5- فرضية تساوي الاحتمالات:

(a) تعريف:

ليكن  $(\Omega, p)$  فضاء احتمالياً ممتداً.

نقول إن هذا الفضاء يحقق فرضية تساوي الاحتمالات إذا وفقط إذا كان لكل إمكانيات نفس الاحتمال.

ليكن  $(\Omega, p)$  فضاء احتمالياً يحقق فرضية تساوي الاحتمالات

\* نضع:  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

لحسب احتمال الأحداث الابتدائية:

لدينا:  $p(a_1) = p(a_2) = \dots = p(a_n) = x$

ولدينا:  $p(a_1) + p(a_2) + \dots + p(a_n) = 1$

يعني:  $x + x + \dots + x = 1$   
n مرة

يعني  $nx = 1$

يعني  $x = \frac{1}{n}$

أي  $x = \frac{1}{card\Omega}$

إذن:  $\forall i \in \{1, 2, \dots, n\} \quad p(a_i) = \frac{1}{card\Omega}$

\* ليكن  $A$  حدثاً بحيث

لدينا  $A$  يحتوي على  $q$  إمكانية. ولدينا  $p(A)$  هو مجموع احتمالات هذه الإمكانيات.

وهذه الإمكانيات لها نفس الاحتمال  $\frac{1}{n}$

إذن  $p(A) = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \dots + \frac{1}{n}$   
q مرة

إذن  $p(A) = q \cdot \frac{1}{n}$

$p(A) = \frac{cardA}{card\Omega}$

خاصية:

ليكن  $(\Omega, p)$  فضاء احتمالياً ممتداً يحقق فرضية تساوي الاحتمالات.

\* احتمال الأحداث الابتدائية هو  $\frac{1}{Card\Omega}$

\* إذا كان  $A$  حدثاً فإن:  $p(A) = \frac{CardA}{Card\Omega}$

ملاحظة:

\* عناصر  $\Omega$  تسمى الحالات الممكنة.

\* عناصر  $A$  تسمى الحالات المرغوب فيها.

$p(a) = \frac{\text{عدد الحالات المرغوب فيها}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$

\* إن فرضية تساوي الاحتمالات يمكن أن تظهر في النص بعبارة صحيحة أو بطريقة غير مباشرة. مثلاً: نرمي نرد

معشوش صندوق يحتوي على كرات لا يمكن التمييز بينها باللمس...

تمارين تطبيقية:

تمرين 1

صندوق يحتوي على 5 بيضاء تحمل الأرقام 1, 2, 3, 4, 5 و 3 كرات سوداء تحمل الأرقام 1, 2, 3.

وكرتان حمراءان تحملان الرقم 1, 2.

نسحب تانياً وعشواياً 3 كرات من الصندوق ( الكرات لا يمكن التمييز بينها باللمس ).

احسب احتمال الحصول على:

(1) 3 كرات بيضاء.

(2) 3 كرات من نفس اللون.

(3) كرة واحدة بالضبط تحمل رقمًا فرديًا.

(4) كرة واحدة على الأقل تحمل رقمًا زوجيًا.

(5) كرة واحدة على الأكثر بيضاء.

(6) 3 كرات تحمل أرقاماً مجموعها زوجي.

(7) 3 كرات من نفس اللون وتحمل أرقاماً مجموعها فردي.

(8) 3 كرات مختلفة الألوان مثنى مثنى.

(9) لونين بالضبط.

ليكن  $\Omega$  كون الإمكانات.

كل إمكانية هي عبارة عن تأليفه ل 3 عناصر من بين 10 عناصر المجموعة  $U$ :

$$U = \{B_1, B_2, B_3, B_4, B_5, N_1, N_2, N_3, R_1, R_2\}$$

$$\text{إذن: } Card\Omega = C_{10}^3 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2} = 120$$

(1) ليكن  $A$  الحدث: "الحصول على 3 كرات بيضاء".

كل إمكانية من  $A$  هي عبارة عن تأليفه ل 3 عناصر من بين عناصر المجموعة:  $\{B_1, B_2, B_3, B_4, B_5\}$

$$\text{إذن: } CardA = C_5^3 = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2} = 10$$

$$\text{إذن: } p(A) = \frac{CardA}{Card\Omega} = \frac{10}{120} = \frac{1}{12}$$

(2) ليكن  $B$  الحدث: "الحصول على 3 كرات من نفس اللون"

"الحدث  $B$  يعني الحصول على  $3N$  أو  $3B$ "

$$\text{إذن: } CardB = C_5^3 + C_3^3 = 10 + 1 = 11$$

$$\text{إذن: } p(B) = \frac{CardB}{Card\Omega} = \frac{11}{120}$$

(3) ليكن  $C$  الحدث: "كرة واحدة بالضبط تحمل رقمًا فرديًا"

الحدث  $C$  يعني الحصول على  $3I$  و  $2P$

إذن:

$$CardC = C_6^1 \cdot C_4^2 = 6 \cdot 6 = 36$$

إذن:

$$p(C) = \frac{CardC}{Card\Omega} = \frac{36}{120} = \frac{3}{10}$$

(4) ليكن  $D$  الحدث: "كرة واحدة على الأقل تحمل رقمًا

زوجيًا"

### تمرين (2):

نرمي نردين وجوه كل واحد مرقمة من 1 إلى 6 وغير مغشوشين.

احسب احتمال الحصول على:

(1) رقمين متساوين.

(2) رقمين مختلفين.

(3) رقمين مجموعهما زوجي.

(4) رقمين مجموعهما أصغر أو يساوي 6.

نرمز لكل إمكانية ب  $(x, y)$  حيث  $x$  الرقم الذي عينه الفرد الأول و  $y$  الرقم الذي عينه الفرد الثاني. ليكن  $\Omega$  كون الإمكانات. كل إمكانية هي عبارة عن ترتيبية بتكرار لعنصرتين من بين 6 عناصر  $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ :

$$Card\Omega = 6^2 = 36 \quad \text{إذن:}$$

(1) ليكن  $A$  الحدث " الحصول على رقمين متساوين ".

$$A = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (6,6)\} \quad \text{لدينا:}$$

$$CardA = 6$$

إذن

$$p(A) = \frac{CardA}{Card\Omega} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6} \quad \text{ومنه:}$$

(2) ليكن  $B$  الحدث " الحصول على رقمين مختلفين".

ليكن  $\bar{B}$  الحدث المضاد  $B$

$$p(\bar{B}) = p(A) \quad \text{إذن} \quad \bar{B} = A$$

$$p(B) = 1 - p(\bar{B}) \quad \text{إذن}$$

$$= 1 - p(A)$$

$$p(B) = 1 - p(A) = \frac{5}{6}$$

(3) ليكن  $C$  الحدث " الحصول على رقمين مجموعهما زوجي ".

|   | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  |
|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

من خلال الجدول لدينا  $CardC = 18$

$$p(C) = \frac{CardC}{Card\Omega} = \frac{18}{36} = \frac{1}{2} \quad \text{إذن:}$$

(4) ليكن  $D$  الحدث " الحصول على رقمين مجموعهما أصغر أو يساوي 6 "

من خلال الجدول لدينا:  $CardD = 15$

$$p(D) = \frac{CardD}{Card\Omega} = \frac{15}{36} \quad \text{إذن}$$

الحدث  $D$  يعني الحصول على:  $(1I ; 2P)$  أو

$(2I ; 1P)$ .

$$CardD = C_4^2 \cdot C_6^1 + C_4^1 \cdot C_6^2 + C_4^3$$

$$= \frac{4 \cdot 3}{2} \cdot 6 + 4 \cdot \frac{6 \cdot 5}{2} + 4 \quad \text{إذن}$$

$$CardD = 100$$

$$p(D) = \frac{CardD}{Card\Omega} = \frac{100}{120} = \frac{5}{6}$$

طريقة 2: ليكن  $\bar{D}$  الحدث المضاد ل  $D$

الحدث  $\bar{D}$  يعني الحصول على  $3I$

$$Card\bar{D} = C_6^3 = 20$$

$$p(\bar{D}) = \frac{20}{120} = \frac{1}{6} \quad \text{إذن:}$$

$$p(D)1 - p(\bar{D}) = \frac{5}{6} \quad \text{إذن}$$

(5) ليكن  $E$  الحدث " كرة واحدة على الأكثري بيضاء "

الحدث  $E$  يعني الحصول على  $(1B ; 2\bar{B})$  أو  $3\bar{B}$

$$CardE = C_5^1 \cdot C_5^2 + C_5^3 = 5 \cdot 10 + 10 = 60$$

$$p(E) = \frac{CardE}{Card\Omega} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2} \quad \text{إذن}$$

(6) ليكن  $F$  الحدث " 3 كرات تحمل أرقاما مجموعها زوجي "

الحدث  $F$  يعني الحصول على  $3P$  أو  $(1P ; 1B_I)$

$$p(F) = \frac{CardF}{Card\Omega} = \frac{64}{120} = \frac{8}{15} \quad \text{إذن}$$

(7) ليكن  $G$  الحدث " 3 كرات من نفس اللون أرقامها مجموعها فردي "

الحدث  $G$  يعني الحصول على  $3B_I$  أو  $(2B_p ; 1B_I)$

$$CardG = C_3^3 + C_3^1 \cdot C_2^2 = 4 \quad \text{إذن:}$$

$$\cdot p(G) = \frac{CardG}{Card\Omega} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30} \quad \text{إذن}$$

(8) ليكن  $H$  الحدث " 3 كرات مختلفة الألوان متشابهة ."

الحدث  $H$  يعني الحصول على  $\{1R, 1N, 1B\}$

$$CardH = C_5^1 + C_3^1 \cdot C_2^1 = 30 \quad \text{إذن:}$$

$$p(H) = \frac{CardH}{Card\Omega} = \frac{30}{120} = \frac{1}{4} \quad \text{إذن:}$$

(9) ليكن  $J$  الحدث " الحصول على لونين بالضبط "

الحدث  $J$  يعني  $\{2N, 1\bar{N}\}$  أو  $\{2B ; 1\bar{B}\}$  أو

$$\{2R, 1\bar{R}\}$$

$$CardJ = C_5^2 \cdot C_5^1 + C_3^2 \cdot C_7^1 + C_2^2 \cdot C_8^1 = 79 \quad \text{إذن:}$$

$$p(J) = \frac{CardJ}{Card\Omega} = \frac{79}{120} \quad \text{إذن:}$$

### III - الاحتمال الشرطي:

**(1) مثال:**

نرمي نردين غير مغشوشين:  $A$  و  $B$ . وجوه كل واحد منها مرقمة من 1 إلى 6. ليكن  $\Omega$  كون الإمكانيات.

$$\Omega = E \times E / E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$Card\Omega = 36$$

ليكن  $B$  الحدث: "الحصول على مجموع أكبر أو يساوي 10".

$$B = \{(4, 6), (5, 5), (5, 6), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$$

$$p(B) = \frac{CardB}{Card\Omega} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

نفترض أننا قد علمنا أن النرد  $A$  قد عين الرقم 6.

أمام هذا الخبر تصبح الحالات الممكنة:

$$\{(6, 1), (6, 2), (6, 3), (6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$$

والحالات المرغوب فيها:

$$\{(6, 4), (6, 5), (6, 6)\}$$

إذن احتمال  $B$  يصبح:

$$p(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

هذا الاحتمال يسمى احتمال الحدث  $B$  علما أن الحدث  $A$  قد تحقق حيث  $A$  هو الحدث "النرد  $A$  عين رقم 6".

ونرمز له ب  $P_1(B)$  أو  $p(B/A)$ .

$$P_1(B) = \frac{1}{2}$$

**ملاحظة:**

$$p(B/A) = \frac{3}{6} = \frac{3/36}{6/36}$$

$$= \frac{\frac{Card(A \cap B)}{Card\Omega}}{\frac{CardA}{Card\Omega}} = \frac{P(A \cap B)}{p(A)}$$

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

إذن

**(2) تعريف:**

ليكن  $(\Omega, p)$  فضاء احتماليا متهيا. ليكن  $A$  و  $B$  حدثين بحيث  $A \neq B$ . نسمي احتمال الحدث  $B$  علما أن الحدث  $A$  محقق العدد الذي نرمز له ب  $p_A(B)$  أو  $p(B/A)$  والمعرف بما يلي:

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

**ملاحظة:**

إذا كانت لدينا فرضية تساوي الاحتمالات فإن:

$$p(B/A) = \frac{Card(A \cap B)}{CardA}$$

**تمارين تطبيقية:**

**تمرين (1):**

صندوقي يحتوي على 6 كرات حمراء تحمل الأرقام 0, 0, 1, 1, 1, 1 و 8 كرات بيضاء: 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1.

نسحب تأثيرا كرتين من الصندوق

(1) إذا كانت الكرتان المسحوبتان تحملان الرقم 1، فما هو الاحتمال لكي تكونا بيضاوين؟

(2) احسب احتمال الحصول على كرتين تحملان نفس اللون علما أنهما تحملان الرقم 1.

ليكن  $\Omega$  كون الإمكانيات. لدينا:

$$Card\Omega = C_{14}^2 = \frac{14 \times 13}{2} = 91$$

(1) ليكن  $A$  الحدث "الحصول على كرتين تحملان الرقم 1"

وليكن  $B$  الحدث "الحصول على كرتين بيضاوين".

الاحتمال المطلوب هو  $p(B/A)$

$$p(B/A) = \frac{p(B \cap A)}{p(A)}$$

$$CardA = C_9^2 = 36$$

ولدينا

$$p(A) = \frac{36}{91}$$

إذن:

الحدث  $A \cap B$  يعني الحصول على 2B وتحملان الرقم 1.

$$Card(A \cap B) = C_5^2 = 10$$

إذن

$$p(A \cap B) = \frac{10}{91}$$

إذن

$$p(B/A) = \frac{\frac{10}{91}}{\frac{36}{91}} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18}$$

ومنه:

$$p(B/A) = \frac{5}{18}$$

إذن

(2) ليكن  $C$  الحدث "الحصول على كرتين من نفس اللون"

الاحتمال المطلوب هو  $p(C/A)$

$$p(C/A) = \frac{p(A \cap C)}{p(A)}$$

$$p(A) = \frac{36}{91}$$

لدينا

الحدث  $A \cap C$  يعني الحصول على كرتين من نفس اللون وتحملان الرقم 1. يعني الحصول على  $2B_1$  أو  $2R_1$ .

$$Card(A \cap C) = C_5^2 + C_4^2 = 10 + 6 = 16$$

إذن:

$$p(A \cap C) = \frac{16}{91}$$

إذن

**ملاحظة:**  
إذا كان  $p(A \cap B) = p(B) \cdot p(A/B)$  فإن:  $p(B) \neq 0$  تمارين تطبيقية:

**تمرين (1):**  
صندوقيان  $U_1$  و  $U_2$  بحيث  $U_1$  يحتوي على  $4B$  و  $3R$ ,  $U_2$  يحتوي على  $2B$  و  $5R$ .  
نسحب كرتين في آن واحد من  $U_1$  نضعهما في  $U_2$  ثم نسحب كرتين ثالثين من  $U_2$ .  
(1) احسب احتمال الحصول على 4 كرات بيضاء.  
(2) احسب احتمال الحصول على كرة بيضاء على الأقل.  
(3) احسب احتمال الحصول على كرة بيضاء بالضبط.

(1) ليكن  $A$  الحدث "الحصول على  $2B$  في السحبة الأولى" ول يكن  $B$  الحدث "الحصول على  $2B$  في السحبة الثانية".  
الاحتمال المطلوب هو  $p(A \cap B)$

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B/A)$$

$$p(A) = \frac{C_4^2}{C_7^2} = \frac{2}{7}$$

لدينا:

$$p(B/A) = \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{1}{6}$$

و

$$p(A \cap B) = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{42} = \frac{1}{21}$$

إذن:

**ملاحظة:**

يمكن تطبيق صيغة الاحتمالات المركبة بطريقة غير مباشرة بدون إبراز الحدث  $A$  و  $B$  ... كما يلي:

(1) ليكن  $A$  الحدث "الحصول على  $4B$ ".

نرمز لكل إمكانية ب  $(x, y)$  حيث  $x$  نتائج السحبة (1) و  $y$  نتائج السحبة الثانية.

الحدث  $A$  يعني الحصول على  $(2B, 2B)$

$$p(A) = \frac{C_4^2}{C_7^2} \cdot \frac{C_4^2}{C_9^2} = \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{21}$$

إذن:

(2) ليكن  $B$  الحدث "الحصول على بيضاء على الأقل"

ليكن  $\bar{B}$  الحدث المضاد ل  $B$ .

$\bar{B}$  يعني الحصول على  $(2R, 2R)$

$$p(\bar{B}) = \frac{C_3^2}{C_7^2} \cdot \frac{C_7^2}{C_9^2} = \frac{1}{12}$$

إذن:

$$p(B) = 1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$$

ومنه

(3) ليكن  $C$  الحدث "الحصول على كرة بيضاء بالضبط"  
الحدث  $C$  يعني الحصول على  $(\{B, R\}, 2R)$  أو  $(\{R, B\}, 2R)$

$$p(C) = \frac{C_3^2}{C_7^2} \cdot \frac{C_2^1 \cdot C_7^1}{C_9^2} + \frac{C_4^1 \cdot C_3^1}{C_7^2} \cdot \frac{C_6^2}{C_9^2}$$

إذن

$$p(C/A) = \frac{p(A \cap C)}{p(A)} = \frac{16}{36} = \frac{4}{9}$$

ومنه:

**تمرين (2):**

عائلة لها طفلان.

(1) ما هو الاحتمال الذي يكون الطفلان ذكرين علماً أن أكبرهما ذكر؟

(2) ما هو الاحتمال الذي يكون الطفلان ذكرين علماً أن أحدهما ذكر؟

نرمز لكل إمكانية بالزوج  $(x, y)$  حيث  $x$  الطفل الكبير و  $y$  الطفل الصغير.

ليكن  $\Omega$  كون الإمكانات. لدينا:

$$\Omega = \{(G, G); (G, F); (F, G); (F, F)\}$$

(1) ليكن  $A$  الحدث "أكبر الطفلين ذكر".  
وليكن  $B$  الحدث "الطفلان ذكراً".

الاحتمال المطلوب  $p(B/A)$

$$p(B/A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$$

لدينا:

$$A = \{(G, G), (G, F)\}$$

$$A \cap B = \{(G, G)\}$$

و

$$p(A) = \frac{2}{4} \quad \text{et} \quad p(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

إذن

$$p(B/A) = \frac{1}{2}$$

إذن

(2) ليكن  $C$  الحدث "أحد الطفلين ذكر".

الاحتمال المطلوب هو  $p(B/C)$

$$p(B/C) = \frac{p(B \cap C)}{p(C)}$$

لدينا:

$$C = \{(G, G), (G, F), (F, G)\}$$

$$B \cap C = \{(G, G)\}$$

و

$$p(C) = \frac{3}{4} \quad \text{et} \quad p(B \cap C) = \frac{1}{4}$$

إذن

$$p(B/C) = \frac{1}{3}$$

ومنه

**(3) صيغة الاحتمالات المركبة:**  
**خاصية:**

ليكن  $(\Omega, p)$  فضاء احتمالياً متهماً.

ليكن  $A$  و  $B$  حدثين بحيث  $p(A) \neq 0$

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B/A)$$

لدينا:

#### 4) صيغة الاحتمالات الكلية:

**تعريف:**

ليكن  $(\Omega, p)$  فضاء احتمالياً متهياً.

نقول إن الأحداث  $A_1, A_2, \dots, A_n$  أحداثاً تكون تجزئاً لـ  $\Omega$  إذا

$$\begin{aligned} \bigcup_{i=1}^n A_i &= \Omega && \text{و فقط إذا كان:} \\ \forall i \neq j \quad A_i \cap A_j &\neq \emptyset && \end{aligned}$$

**مثال:**

$\bar{A} \cup A$  يكونان تجزئاً لـ  $\Omega$ .

**خاصية** (صيغة الاحتمالات الكلية):

ليكن  $(\Omega, p)$  فضاء احتمالياً متهياً.

أحداثاً تكون تجزئاً لـ  $\Omega$

كل حدث  $B$  لدينا:

$$p(B) = p(A_1)p(B/A_1) + p(A_2)p(B/A_2) + \dots + p(A_n)p(B/A_n)$$

$$= \sum_{i=1}^n p(A_i)p(B/A_i)$$

**برهان:**

$$B \subset \Omega \quad \text{لدينا}$$

$$B = B \cap \Omega \quad \text{لدينا}$$

$$= B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n)$$

$$= (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$$

ولدينا

$$\forall i \neq j \quad (B \cap A_i) \cap (B \cap A_j) = \emptyset$$

$$(B \cap A_i) \subset A_i \quad \text{لأن}$$

$$A_i \cap A_j \neq \emptyset \quad \text{و } B \cap A_i \neq \emptyset \quad \text{و } B \cap A_j \neq \emptyset$$

لدينا

$$p(B) = p(A_1 \cap B) + p(A_2 \cap B) + \dots + p(A_n \cap B)$$

$$= p(A_1)p(B/A_1) + p(A_2)p(B/A_2) + \dots + p(A_n)p(B/A_n)$$

**تمارين تطبيقية:**

**تمرين (1):**

نعتبر 3 صناديق  $U_1, U_2, U_3$  بحيث  $U_1$  يحتوي على 2B و

$U_2$  يحتوي على 3B و  $U_3$  يحتوي على 4N و  $3N$  و  $5B$  و  $3N$ .

نختار عشوائياً صندوقاً من بين الصناديق الثلاثة، ونسحب منه كرتين. تأكيداً كرتين.

(1) احسب احتمال الحصول على كرتين بيضاوين.

(2) إذا علمنا أن الكرتين المسحوبتين من نفس اللون، فما هو

الاحتمال لكي تكونا مسحوبتين من  $U_3$ ؟

**الحل**

(1) ليكن  $A$  الحدث "الحصول على كرتين بيضاوين"

ليكن  $i \in \{1, 2, 3\}$  الحدث "اختيار الصندوق  $U_i$ "

$$p(A_i) = \frac{1}{3} \quad \text{لدينا:}$$

$$= \frac{3}{21} \cdot \frac{2.7}{36} + \frac{4.3}{21} \cdot \frac{15}{36}$$

$$p(C) = \frac{1}{18} + \frac{5}{21}$$

**تمرين (2):**

صندوق يحتوي على  $2N; 3B; 4R$

نسحب بتنازع وبدون إحلال 3 كرات من الصندوق.

احسب احتمال الحصول على:

(1) 3 كرات بيضاء.

(2) كرة بيضاء بالضبط.

(3) كرة بيضاء على الأقل.

(4) 3 كرات من نفس اللون.

نرمز لكل إمكانية بـ  $(x, y, z)$  حيث  $x$  نتيجة السحبة (1).

$y$  نتيجة السحبة (2) و  $z$  نتيجة السحبة (3).

(1) ليكن  $A$  الحدث "الحصول على 3B".

• يعني الحصول على  $(B, B, B)$ .

$$\therefore p(A) = \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{84}$$

إذن:

(2) ليكن  $B$  الحدث "الحصول على كرة بيضاء بالضبط".

الحدث  $B$  يعني الحصول على  $(B, \bar{B}, \bar{B})$  أو  $(\bar{B}, B, \bar{B})$  أو  $(\bar{B}, \bar{B}, B)$ .

إذن:

$$p(B) = \left( \frac{3}{9} \cdot \frac{6}{8} \cdot \frac{5}{7} \right) + \left( \frac{6}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} \right) + \left( \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} \right) = \frac{15}{28}$$

(3) ليكن  $C$  الحدث "الحصول على بيضاء على الأقل".

ليكن  $\bar{C}$  الحدث المضاد لـ  $C$ .

•  $(\bar{B}, \bar{B}, \bar{B})$  يعني الحصول على  $\bar{C}$ .

$$\therefore p(\bar{C}) = \frac{6}{9} \cdot \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} = \frac{5}{21}$$

$$p(C) = 1 - \frac{5}{21} = \frac{16}{21}$$

ومنه:

(4) ليكن  $D$  الحدث "الحصول على 3 كرات من نفس اللون".

الحدث  $D$  يعني الحصول على  $(R, R, R)$  أو  $(B, B, B)$ .

$$\therefore p(D) = \left( \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \right) + \left( \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{7} \right)$$

$$p(D) = \frac{5}{84}$$

تعتيم:

$$p(A \cap B \cap C \cap D) = p(A)p(B/A)p(C/A \cap B)p(D/A \cap B \cap C)$$

ليكن  $F$  الحدث " اختيار النرد  $C$ .  
الاحتمال المطلوب هو  $p(F/E)$

$$p(F/E) = \frac{p(E \cap F)}{p(E)}$$
 لدينا:

ولدينا  $(E \cap F)$  يعني:  $(C, R)$

$$p(E \cap F) = \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{6} = \frac{5}{18}$$
 إذن:

ولدينا  $E$  يعني  $(A, P)$  أو  $(B, P)$

$$p(E) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{6} + \frac{1}{3} \cdot \frac{5}{6} = \frac{10}{18}$$
 إذن

$$p(F/E) = \frac{1}{2}$$
 ومنه:

### (5) الاستقلالية: (a) الأحداث المستقلة:

**تعريف:**

ليكن  $(\Omega, p)$  فضاء احتماليا منتهيا.  
نقول إن الحدين  $A$  و  $B$  مستقلين إذا وفقط إذا كان:

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$$

**ملاحظة:**

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B)$$
 لدينا:

$$p(A) \cdot p(B/A) = p(A) \cdot p(B)$$
 يعني:

$$p(B/A) = p(B)$$
 يعني:

ويعني كذلك:

$$p(A) = p(A/B)$$

إذن يكون الحدين  $A$  و  $B$  مستقلين إذا وفقط إذا كان تحقيق أحدهما لا يؤثر على تحقيق الآخر.

**تمرين:**

نعتبر تلميذين  $x$  و  $y$  اجتازا اختبارا.

احتمال نجاح التلميذ  $x$  هو  $\frac{1}{3}$  واحتمال نجاح  $y$  هو  $\frac{2}{5}$

(1) احسب احتمال نجاح التلميذين معا.

(2) احسب احتمال نجاح التلميذ  $x$  فقط.

(3) احسب احتمال نجاح تلميذ واحد فقط.

(4) احسب احتمال نجاح تلميذ واحد على الأقل.

**الحل**

(1) ليكن  $A$  الحدث " نجاح التلميذ  $x$ "

وليكن  $B$  الحدث " نجاح التلميذ  $y$ ".

الاحتمال المطلوب هو  $p(A \cap B)$

من خلال النص يظهر أن الحدين  $A$  و  $B$  مستقلان.

$$p(A \cap B) = p(A) \cdot p(B) = \frac{2}{15}$$
 إذن:

لدينا الأحداث  $A_3, A_2, A_1$  تكون تجزئاً ل  $\Omega$ . إذن حسب صيغة الاحتمالات الكلية لدينا:

$$p(A) = p(A_1) p(A/A_1) + p(A_2) p(A/A_2) + p(A_3) p(A/A_3)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{C_2^2}{C_5^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{C_3^2}{C_7^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{C_5^2}{C_8^2}$$

$$p(A) = \frac{1}{5}$$

**ملاحظة:**

يمكن تطبيق صيغة الاحتمالات الكلية بطريقة غير مباشرة كما يلي:

نرمز لكل إمكانية بالزوج  $(x, y)$  حيث  $x$  نتيجة اختيار الصندوق و  $y$  نتيجة السحب.

ليكن  $A$  الحدث " الحصول على  $2B$ ".  
الحدث  $A$  يعني الحصول على  $(U_2, 2B)$  أو  $(U_1, 2B)$  أو  $(U_3, 2B)$ .

$$p(A) = \frac{1}{3} \cdot \frac{C_2^2}{C_5^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{C_3^2}{C_7^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{C_5^2}{C_8^2} = \frac{1}{5}$$
 إذن

(2) ليكن  $B$  الحدث " الكرتان المسحوبتان من نفس اللون".  
ليكن  $A_3$  الحدث " اختيار الصندوق  $U_3$ ".

الاحتمال المطلوب هو  $p(A_3/B)$

$$p(A_3/B) = \frac{p(A_3 \cap B)}{p(B)}$$
 لدينا:

ولدينا  $(A_3 \cap B)$  يعني الحصول على

$$p(A_3 \cap B) = \frac{1}{3} \left( \frac{C_5^2 + C_3^2}{C_8^2} \right) = \frac{13}{84}$$
 إذن:

ولدينا  $B$  يعني الحصول على  $(U_1, 2B, 2N)$  أو  $(U_3, 2B, 2N)$  أو  $(U_2, 2B, 2N)$ .

إذن:

$$p(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{C_2^2 + C_3^2}{C_5^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{C_3^2 + C_4^2}{C_7^2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{C_5^2 + C_3^2}{C_8^2} = \frac{307}{420}$$

$$p(A_3/B) = \frac{65}{307}$$
 ومنه:

**تمرين (2):**

صندوق يحتوي على 3 نرود. النرد  $A$  له وجهان يحملان رقم زوجيا و 4 أوجه تحمل أرقاما فردية.

النرد  $B$  له 3 أوجه تحمل رقم زوجي و 3 أوجه تحمل رقم فردي.

النرد  $C$  له 5 أوجه تحمل رقم زوجي ووجه يحمل رقم فردي.

اخترنا عشوائيا أحد النرود ورمييه فإذا به يعين رقم زوجيا.  
ما هو الاحتمال الذي يكون النرد الذي تم رمييه هو النرد  $C$ ؟

**الحل**

نرمز لكل إمكانية بالزوج  $(x, y)$  حيث  $x$  نتيجة اختيار النرد و  $y$  نتيجة رمي النرد.

ليكن  $E$  الحدث " الحصول على رقم زوجي".

### ملاحظة:

- نرمز لكل إمكانية ب  $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$  حيث  $x_i$  هي نتيجة الرمية رقم  $i$ .  
 . ل يكن  $A$  الحدث " الحصول على مضاعف ل 3 في رمية واحدة "

$$p(A) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad \text{لدينا}$$

. ل يكن  $B$  الحدث " الحصول على مضاعف ل 3 مرتين بالضبط "

الحدث  $B$  يعني " الحدث  $A$  يتحقق مرتين بالضبط "  
 إذن الحدث  $B$  مكون من الخصائص المكونة من  $3A$  و  $\bar{A}$  ومن أجل تكوين خصائص من هذا النوع يكفي اختيار مكانين ما بين 5 أماكن نضع فيها  $A$  و  $\bar{A}$  في الباقي.

وعدد إمكانيات اختيار مكانين من بين 5 أماكن هو  $C_5^2$   
 إذن عدد هذه الخصائص هو  $C_5^2$   
 واحتمال كل واحد منها هو:

$$\begin{aligned} p &= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) \\ &= \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^3 \\ p(B) &= C_5^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{3}\right)^3 \quad \text{إذن:} \\ p(B) &= 640 \end{aligned}$$

### خاصية:

- نعتبر  $n$  اختبار مستقل.  
 ليكن  $A$  حدث احتمال تحقيقه في اختبار واحد هو  $p$  ، ولا يتغير خلال الاختبارات.  
 ليكن  $B$  الحدث " الحدث  $A$  يتحقق  $K$  مرة بالضبط ".  

$$p(B) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \quad \text{لدينا:}$$

### برهان:

نفس الطريقة المتتبعة في التمرين السابق.

### تمرين تطبيقية:

#### تمرين (1):

- صندوق يحتوي على  $2N, 4R, 3B$  .  
 نسحب ثانية 3 كرات من الصندوق ونعيد هذه التجربة 6 مرات مع إرجاع الكرات بعد كل تجربة.  
 - ما هو احتمال الحصول على 3 كرات من نفس اللون 4 مرات بالضبط؟

### الحل

- ليكن  $A$  الحدث " الحصول على 3 كرات من نفس اللون في سحبة واحدة " .

$$p(A) = \frac{C_3^3 + C_4^3}{C_9^3} = \frac{5}{84} \quad \text{لدينا}$$

- ليكن  $B$  الحدث " الحصول على 3 كرات من نفس اللون 4 مرات بالضبط ".  
 الحدث  $B$  يعني " الحدث  $A$  يتحقق 4 مرات ".  
 إذن:

### ملاحظة:

يمكن تطبيق صيغة الاستقلالية بطريقة غير مباشرة كما يلي:  
 نرمز لكل إمكانية بالزوج  $(a,b)$  حيث  $a$  هي نتيجة  $x$  و  $b$  نتيجة التلميذ  $y$

$R$  يعني نجاح التلميذ و  $\bar{R}$  عدم نجاحه  
 (1) ليكن  $E$  الحدث " نجاح  $x$  و  $y$  ".  
 (2) يعني  $E$  .

$$p(E) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} = \frac{2}{15} \quad \text{إذن:}$$

(2) ليكن  $F$  الحدث " نجاح التلميذ  $x$  فقط "  
 $(R, \bar{R})$  يعني  $F$

$$p(F) = \frac{1}{3} \cdot \left(1 - \frac{2}{5}\right) = \frac{1}{5} \quad \text{إذن:}$$

(3) ليكن  $G$  الحدث " نجاح تلميذ واحد فقط ".  
 $(\bar{R}, R)$  أو  $(R, \bar{R})$  يعني  $G$

$$p(G) = \frac{1}{3} \left(1 - \frac{2}{5}\right) + \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \frac{2}{5} \quad \text{إذن:}$$

$$p(G) = \frac{7}{15} \quad (4) \text{ ليكن } H \text{ الحدث " نجاح تلميذ على الأقل "}$$

ل يكن  $\bar{H}$  الحدث المضاد ل  $H$ .  
 $(\bar{R}, \bar{R})$  يعني  $\bar{H}$

$$p(\bar{H}) = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{5}\right) = \frac{2}{5} \quad \text{إذن:}$$

$$p(H) = 1 - p(\bar{H}) = 1 - \frac{2}{5} \quad \text{ومنه}$$

$$p(H) = \frac{3}{5} \quad (b) \text{ الاختبارات المستقلة:}$$

### تعريف:

يمكن لتجربة أن تكون مكونة من اختبار واحد أو من عدة اختبارات، ونقول إن هذه الاختبارات مستقلة إذا كانت نتائج إحداها لا تؤثر على الباقي.

### أمثلة:

- (1) إذا رميينا قطعة نقود عدة مرات فإن الاختبارات تكون مستقلة.

(2) السحب بتتابع وباحتلال يشكل اختبارات مستقلة.

- (3) إذا رميينا نفس النرد عدة مرات تكون الاختبارات مستقلة.

(4) إذا كانت تجربة تتكرر في نفس الظروف فإن الاختبارات تكون مستقلة.

### تمرين:

- نرمي نرد وجده رقمية من 1 إلى 6 ، 5 مرات.  
 احسب احتمال الحصول على مضاعف ل 3 مرتين بالضبط.

$$p(B) = C_{10}^6 \left(\frac{2}{5}\right)^6 \cdot \left(1 - \frac{2}{5}\right)^4$$

إذن:

$$p(B) = C_{10}^6 \left(\frac{2}{5}\right)^6 \left(\frac{3}{5}\right)^4$$

### تمرين (5):

- يحتوي صندوق على 4 كرات حمراء و 3 كرات خضراء.  
نسحب كرة واحدة من الصندوق.
- \* إذا كانت حمراء نسحب تانيا كرتين من بين باقي الكرات.
  - \* إذا كانت خضراء نسحب بتابع وبدون إخلال كرتين من بين باقي الكرات.
- (1) ما هو عدد الحالات الممكنة؟  
 (b) احسب احتمال الحصول على 3 كرات من نفس اللون.  
 (2) إذا علمنا أنه حصلنا على كرتين خضراوين بالضبط، فما هو الاحتمال لكي تكون الكرة الأولى المسحوبة خضراء؟

### الحل

- (1) نرمز لكل إمكانية ب  $(x, y)$  حيث  $x$  نتيجة السحبة الأولى و  $y$  نتيجة السحبة الثانية.  
 (a) ليكن  $\Omega$  كون الإمكانات.  
 الحالات الممكنة مكونة من:  
 - الحالات التي تتحقق فيها على كرة حمراء في السحبة الأولى وعدها هو:  $4 \cdot C_6^2 = 4 \times 15 = 60$   
 - الحالات التي تتحقق فيها على كرة خضراء في السحبة الأولى وعدها هو:  $3 \times 6 \times 5 = 90$   
 ومنه:

$$\text{Card } \Omega = 150$$

- (b) ليكن  $A$  الحدث "الحصول على 3 كرات من نفس اللون"  $A$  يعني الحصول على  $(R, R, R)$  أو  $(V, V, V)$   
 إذن:

$$p(A) = \frac{4}{7} \cdot \frac{C_3^2}{C_6^2} + \frac{3}{7} \cdot \left(\frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5}\right)$$

$$p(A) = \frac{1}{7}$$

- (2) ليكن  $B$  الحدث "الحصول على  $2V$  بالضبط".  
 ليكن  $C$  الحدث "الكرة الأولى خضراء"

$$\text{الاحتمال المطلوب هو } p(C/B) = \frac{p(C \cap B)}{p(B)}$$

لدينا

$$(V, (R, V)) \text{ أو } (V, (V, R)) \text{ يعني } B \cap C \text{ لدينا}$$

$$p(B \cap C) = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} + \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{5}$$

إذن:

$$= 2 \cdot \left(\frac{3}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5}\right) = \frac{8}{35}$$

$$p(B) = C_6^4 p(A)^4 (1 - p(A))^{6-4}$$

$$p(B) = C_6^4 \left(\frac{5}{84}\right)^4 \left(\frac{79}{84}\right)^2$$

### تمرين (2):

صندوق يحتوي على  $2N, 4R, 3B$  نسحب بتابع وبإخلال 6 كرات من الصندوق.  
 ما هو احتمال الحصول على كرة حمراء مرتين بالضبط؟

### الحل

ليكن  $A$  الحدث "الحصول على كرة حمراء في سحبة واحدة"

$$\text{لدينا: } p(A) = \frac{4}{9}$$

ليكن  $B$  الحدث "الحصول على كرة حمراء مرتين بالضبط"  
 يعني "الحدث  $A$  يتحقق مرتين بالضبط".

$$\text{إذن: } p(B) = C_6^2 p(A)^2 (1 - p(A))^{6-2}$$

$$p(B) = C_6^2 \left(\frac{4}{9}\right)^2 \left(\frac{5}{9}\right)^4$$

### تمرين (3):

رام يتمرن على إصابة هدف.

$$\text{احتمال إصابة الهدف في طلقة واحدة هو: } p = \frac{2}{3}$$

ما هو احتمال إصابة الهدف 6 مرات بعد 20 طلقة؟

### الحل

ليكن  $A$  الحدث "إصابة الهدف في طلقة واحدة".

$$\text{لدينا: } p(A) = \frac{2}{3}$$

ليكن  $B$  الحدث "إصابة الهدف 6 مرات".

يعني "الحدث  $A$  يتحقق 6 مرات بالضبط".

$$\text{إذن: } p(B) = C_{20}^6 \left(\frac{2}{3}\right)^6 \cdot \left(1 - \frac{2}{3}\right)^{14}$$

$$p(B) = C_{20}^6 \left(\frac{2}{3}\right)^6 \left(\frac{1}{3}\right)^{14}$$

### تمرين (4):

يقوم مراقب بزيارة تاجر في مدينة، وعدهم 20 في كل زيارة الاحتمال لكي يجد المراقب التاجر موجودا هو

$$p = \frac{2}{5}$$

قام المراقب ب 10 زيارات. ما هو الاحتمال لكي يكون المراقب قد وجد 6 تجار.

### الحل

ليكن  $A$  الحدث "المراقب يجد التاجر في زيارته واحدة"

$$\text{لدينا: } p(A) = \frac{2}{5}$$

ليكن  $B$  الحدث "المراقب يجد 6 تجار في الزيارات العشر"  
 يعني "الحدث  $A$  يتحقق 6 مرات بالضبط".

الحدث  $B$  يعني  $(V, (V, R))$  أو  $(V, (R, V))$  - . $(R, \{2V\})$

$$p(B) = \frac{8}{35} + \frac{4}{7} \cdot \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{12}{35}$$

$$p(C/B) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$$