Exercice 1

Dans chacune des situations suivantes, déterminer la valeur de t .

1. Le chiffre des ventes d'un magazine a augmenté de 25 % puis diminué de $t\%$. Globalement il a augmenté de 16%.

D'après l'énoncé, on a : $1,16 = CM_g$

D'autre part, on sait que $CM_g = 1,25 \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$

$$\text{donc } 1 + \frac{t}{100} = \frac{CM_g}{1,25} = \frac{1,16}{1,25}$$

$$\text{d'où } \frac{t}{100} = \frac{1,16}{1,25} - 1 \text{ soit } t = 100 \times \left(\frac{1,16}{1,25} - 1\right) = -7,2$$

Conclusion : on trouve $t = -7,2$

En d'autres termes, une hausse de 25 % suivie d'une baisse de 7,2 % équivalent à une hausse de 16 %.

2. Après deux hausses successives de $t\%$, le nombre d'abonnés sur un réseau social a globalement augmenté de 96 %.

D'après l'énoncé, on a : $1,96 = CM_g$

D'autre part, on sait que $CM_g = \left(1 + \frac{t}{100}\right) \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$

$$\text{donc } \left(1 + \frac{t}{100}\right)^2 = 1,96 \text{ (**)} \text{ d'où } 1 + \frac{t}{100} = \sqrt{1,96} \text{ ou } 1 + \frac{t}{100} = -\sqrt{1,96}$$

$$\frac{t}{100} = \sqrt{1,96} - 1 \text{ ou } \frac{t}{100} = -\sqrt{1,96} - 1$$

$$\text{Puis } t = 100 (\sqrt{1,96} - 1) \text{ ou } t = 100 \times (-\sqrt{1,96} - 1)$$

$$\text{Enfin } t = 40 \text{ ou } t = -280$$

Conclusion : On rejette la solution négative étant donné que si l'on avait deux baisses successives, on ne pourrait avoir une hausse à la fin, donc on ne gardera que : $t = 40$.

En d'autres termes, deux hausses successives de 40 % équivalent à une hausse de 96 %.

()** : Pour a réel positif, l'équation $X^2 = a$ équivaut à $X = \sqrt{a}$ ou $X = -\sqrt{a}$

3. Suite à un régime, le poids de Teva a baissé de $t\%$, puis il a augmenté de $t\%$. Globalement il a perdu 9 % de son poids initial.

D'après l'énoncé, on a : $0,91 = CM_g$

D'autre part, on sait que $CM_g = \left(1 - \frac{t}{100}\right) \times \left(1 + \frac{t}{100}\right)$

$$\text{donc } 1 - \frac{t^2}{100^2} = 0,91 \text{ d'où } \frac{t^2}{100^2} = 1 - 0,91 = 0,09$$

$$\text{soit } t^2 = 100^2 \times 0,09 \text{ ou encore } t^2 = 900$$

$$\text{Enfin } t = \sqrt{900} = 30 \text{ ou } t = -\sqrt{900} = -30.$$

Conclusion : on peut garder les deux valeurs.

En d'autres termes, une baisse de 30 % suivie d'une hausse de 30 % équivalent à une baisse de 9 %. Mais aussi, une hausse de 30 % suivie d'une baisse de 30% équivalent à une baisse de 9 %.

4. Le prix d'une action en bourse a augmenté de $t\%$ puis de $2t\%$ durant la même journée. A la clôture, son prix a globalement été multiplié par 1,32.

D'après l'énoncé, on a : $1,32 = CM_g$

D'autre part, on sait que $CM_g = \left(1 + \frac{t}{100}\right) \times \left(1 + \frac{2t}{100}\right)$

$$\text{donc } 1 + \frac{2t}{100} + \frac{t}{100} + 2 \frac{t^2}{100^2} = 1,32$$

$$\text{d'où } 2 \frac{t^2}{100^2} + 3 \frac{t}{100} - 0,32 = 0$$

$$\text{ou encore } 2 t^2 + 300 t - 3200 = 0 \text{ (on multiplie tout par } 100^2)$$

On a une équation du 2nd degré : $\Delta = 300^2 - 4(2)(-3200) = 115\,600$

Il y a 2 solutions : $t_1 = \frac{-300 - \sqrt{115\,600}}{4} = -160$ et $t_2 = \frac{-300 + \sqrt{115\,600}}{4} = 10$.

Conclusion : on ne peut garder que la valeur positive ce qui correspond à une hausse. Si on avait eu deux baisses successives, on ne pourrait avoir une hausse.

En d'autres termes, une hausse de 10 % suivie d'une hausse de 20 % équivalent à une hausse de 32 %.

Exercice 2

On considère la fonction f définie sur $[-2 ; 3]$ par : $f(x) = -x^2 + x + 2$ et la fonction g définie sur $[-2 ; 3]$ par $g(x) = -x + 2$.

1. a. Montrer que pour tout réel x , $f(x) = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4}$.

$$\text{Pour tout réel } x, -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{9}{4} = -\left(x^2 - x + \frac{1}{4}\right) + \frac{9}{4} = -x^2 + x - \frac{1}{4} + \frac{9}{4} = -x^2 + x + \frac{8}{4} = -x^2 + x + 2 = f(x)$$

- b. En déduire le tableau de variation de f . On justifiera avec soin la réponse.

D'après la question précédente, on a la forme canonique de f (sous la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $a = -1$, $\alpha = \frac{1}{2}$ et $\beta = \frac{9}{4}$). Comme $a < 0$, la parabole représentant f est orientée vers le bas, et comme $\alpha = \frac{1}{2}$, on en déduit que la fonction f est strictement croissante sur $]-\infty ; \frac{1}{2}[$ puis strictement décroissante sur $]\frac{1}{2} ; +\infty[$.

On a donc le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
f			

2. Dresser en justifiant les résultats le tableau de variation de la fonction g .
 g est une fonction affine (de la forme $ax + b$ avec $a = -1$ et $b = 2$). Comme $a < 0$, alors la fonction g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$ d'où le tableau de variation suivant :

x	$-\infty$	$+\infty$
g		

3. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de chaque courbe avec l'axe des ordonnées.

- Avec l'axe des ordonnées :

$g(0) = 2$ donc la droite représentant g rencontre l'axe des ordonnées au point A de coordonnées $(0 ; 2)$

$f(0) = 2$ donc la parabole représentant f rencontre l'axe des ordonnées au même point A .

4. Déterminer les coordonnées des points d'intersection de chaque courbe avec l'axe des abscisses.

Avec l'axe des abscisses :

$$g(x) = 0 \text{ équivaut à } -x + 2 = 0 \text{ d'où } x = 2$$

Conclusion : la droite représentant g rencontre l'axe des abscisses au point B de coordonnées $(2 ; 0)$

$$f(x) = 0$$

$$\Delta = (1)^2 - 4(-1)(2) = 9$$

On en déduit que f admet 2 racines : $x_1 = \frac{-1 - \sqrt{9}}{-2} = 2$ et $x_2 = \frac{-1 + \sqrt{9}}{-2} = -1$

Conclusion : la parabole représentant f rencontre l'axe des abscisses aux points $C(-1 ; 0)$ et $B(2 ; 0)$

5. Tracer les courbes des fonctions f et g dans un même repère d'unité 2 cm sur chaque axe.

Pour tracer soigneusement une courbe, on place plusieurs points. Pour cela on dresse un tableau de valeurs :

Pour représenter la fonction f :

x	-2	-1,5	-1	-0,5	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3
$f(x)$	-4	-1,75	0	1,25	2	2,25	2	1,25	0	-1,75	-4

Pour représenter la fonction g :

x	-2	3
$g(x)$	0	-1

G étant une fonction affine, sa représentation graphique est une droite, il suffit de placer deux points de cette droite, ce qui explique qu'il n'est pas nécessaire de chercher plus de 2 points.

Cela dit, que cela ne vous empêche pas de chercher un ou deux points de plus, ne serait-ce que pour la précision du tracé et aussi pour s'assurer de ne pas faire d'erreurs, dans la mesure où les trois ou quatre points placés doivent être alignés.

6. Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$.

METHODE : Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points communs entre la courbe représentant f et celle représentant g . En d'autres termes, ici il s'agit de lire les abscisses des points communs de la parabole et de la droite.

Par lecture graphique, les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les réels 0 et 2.

(Les 2 points communs sont A et B et ils ont respectivement pour abscisse 0 et 2, d'où la réponse).

7. Résoudre algébriquement l'équation $f(x) = g(x)$ et comparer avec les résultats de la question précédente.

$f(x) = g(x)$ équivaut à $-x^2 + x + 2 = -x + 2$ ou encore à $-x^2 + 2x = 0$

On a une équation du second degré. Il n'est pas utile de chercher le discriminant ...

Ici, $-x^2 + 2x = 0$ équivaut à $x(-x + 2) = 0$ (c'est une équation-produit)

D'où : $x = 0$ ou $x = 2$

Conclusion : On retrouve bien par le calcul, les valeurs 0 et 2.

Rappel :

$$a \times b = 0 \Leftrightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0$$

8. Résoudre graphiquement l'inéquation $g(x) \leq f(x)$ puis retrouver les résultats par le calcul.

METHODE : Pour déterminer graphiquement les solutions de l'inéquation $g(x) \leq f(x)$

1. On commence par repérer la (ou les parties) de la courbe représentant la fonction g située(s) en dessous de celle(s) représentant la fonction f .
2. Ensuite, il ne reste plus qu'à lire les abscisses des points correspondants.

Voir ci-contre (partie en mauve).

Graphiquement l'inéquation $g(x) \leq f(x)$ admet pour solution l'ensemble des réels x de l'intervalle $[0 ; 2]$

Par le calcul :

$$g(x) \leq f(x) \Leftrightarrow -x+2 \leq -x^2+x+2 \Leftrightarrow x^2-2x \leq 0 \Leftrightarrow x(x-2) \leq 0$$

On est amené à résoudre une inéquation du 2nd degré ($x^2 - 2x \leq 0$).

Les solutions de l'équation $x^2 - 2x = 0$ sont 0 et 2. La parabole représentant la fonction $x : \mapsto x^2 - 2x$ est orientée vers le haut (le coefficient de x^2 est 1 qui est positif), et elle coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisse respective 0 et 2.

Du coup, on obtient le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
Signe de $x^2 - 2x$	+	0	-	0	+

Conclusion : $g(x) \leq f(x)$ pour $x \in [0 ; 2]$

Exercice 3

X est une variable aléatoire prenant les valeurs $-2, -1, 0$ et 10 .

On sait que :

- $P(X = -2) = P(X = 10)$; $P(X = -1) = \frac{1}{2} P(X = 0)$ et $P(X = -2) = 3 P(X = -1)$.

Quelle est la loi de probabilité de X ?

D'après l'énoncé, l'ensemble des valeurs prises par X est $\{-2 ; -1 ; 0 ; 10\}$

D'après le cours, on sait que : $P(X = -2) + P(X = -1) + P(X = 0) + P(X = 10) = 1$

Notons $x = P(X = -2)$

D'après l'énoncé, $P(X = 10) = x$;

Comme $3 P(X = -1) = P(X = -2)$ alors $P(X = -1) = \frac{1}{3} P(X = -2) = \frac{1}{3} x$

Et comme $P(X = -1) = \frac{1}{2} P(X = 0)$ alors $P(X = 0) = 2 P(X = -1) = 2 \times \frac{1}{3} x$

En reprenant l'égalité : $P(X = -2) + P(X = -1) + P(X = 0) + P(X = 10) = 1$

On obtient : $x + \frac{1}{3} x + \frac{2}{3} x + x = 1$ soit $3x = 1$ d'où $x = \frac{1}{3}$

Finalement : $P(X = -2) = P(X = 10) = \frac{1}{3}$; $P(X = -1) = \frac{1}{3} x = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ et $P(X = 0) = \frac{2}{3} x = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$

Conclusion : La loi de probabilité de X est donnée par le tableau suivant

x_i	-2	-1	0	10	On a bien $\frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{2}{9} + \frac{1}{3} = 1$
$P(X=x_i)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	

Exercice 4

On lance deux dés tétraédriques non truqués dont les faces sont numérotées 1 à 4.

On note :

S la variable aléatoire égale à la somme des points obtenus sur la face du dessous.

M la variable aléatoire égale au plus grand des deux numéros obtenus.

Donner la loi de probabilité de S et de M puis déterminer leur espérance mathématique.

On peut représenter l'ensemble des issues liées à l'expérience à l'aide du tableau suivant puis préciser pour chacune des issues la valeur prise par S (en bleu)

Dé n° 2 \ Dé n° 1	1	2	3	4
1	(1 ; 1) 2	(1 ; 2) 3	(1 ; 3) 4	(1 ; 4) 5
2	(2 ; 1) 3	(2 ; 2) 4	(2 ; 3) 5	(2 ; 4) 6
3	(3 ; 1) 4	(3 ; 2) 5	(3 ; 3) 6	(3 ; 4) 7
4	(4 ; 1) 5	(4 ; 2) 6	(4 ; 3) 7	(4 ; 4) 8

L'univers Ω contient 16 issues toutes équiprobables. Une issue est modélisée par un couple $(i ; j)$ où i et j sont des entiers compris entre 1 et 4. i désignant le résultat obtenu avec le dé n° 1 et j celui obtenu avec le dé n° 2.

L'ensemble des valeurs prises par S est l'ensemble $\{2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8\}$

La loi de S est donnée par le tableau suivant :

s_i	2	3	4	5	6	7	8	On a bien : $\frac{1}{16} + \frac{2}{16} + \frac{3}{16} + \frac{4}{16} + \frac{3}{16} + \frac{2}{16} + \frac{1}{16} = 1$
$P(S = s_i)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16} = \frac{1}{8}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16} = \frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	

L'espérance $E(S)$ de la variable aléatoire S vérifie :

$$E(S) = 2 \times \frac{1}{16} + 3 \times \frac{2}{16} + 4 \times \frac{3}{16} + 5 \times \frac{4}{16} + 6 \times \frac{3}{16} + 7 \times \frac{2}{16} + 8 \times \frac{1}{16} = \frac{80}{16} = 5$$

Interprétation : Sur un grand nombre d'expériences, en moyenne on peut espérer obtenir une somme égale à 5 par expériences.

On peut représenter l'ensemble des issues liées à l'expérience à l'aide du tableau suivant puis préciser pour chacune des issues la valeur prise par M (en bleu)

Dé n° 2 \ Dé n° 1	1	2	3	4
1	(1 ; 1) 1	(1 ; 2) 2	(1 ; 3) 3	(1 ; 4) 4
2	(2 ; 1) 2	(2 ; 2) 2	(2 ; 3) 3	(2 ; 4) 4
3	(3 ; 1) 3	(3 ; 2) 3	(3 ; 3) 3	(3 ; 4) 4
4	(4 ; 1) 4	(4 ; 2) 4	(4 ; 3) 4	(4 ; 4) 4

L'univers Ω contient 16 issues toutes équiprobables. Une issue est modélisée par un couple $(i ; j)$ où i et j sont des entiers compris entre 1 et 4. i désignant le résultat obtenu avec le dé n° 1 et j celui obtenu avec le dé n° 2. L'ensemble des valeurs prises par M est l'ensemble $\{1 ; 2 ; 3 ; 4\}$

La loi de M est donnée par le tableau suivant :

m_i	1	2	3	4	On a bien : $\frac{1}{16} + \frac{3}{16} + \frac{5}{16} + \frac{7}{16} = 1$
$P(M = m_i)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{5}{16}$	$\frac{7}{16}$	

L'espérance $E(M)$ de la variable aléatoire M vérifie : $E(M) = 1 \times \frac{1}{16} + 2 \times \frac{3}{16} + 3 \times \frac{5}{16} + 4 \times \frac{7}{16} = \frac{50}{16} = 3,125$