



Coq de roche Péruvien

Le Coq-de-roche péruvien est l'Oiseau National du Pérou.



NOM : Coq de roche Péruvien (*Rupicola peruvianus*)

CLASSE : oiseaux

ORDRE : Passériformes

FAMILLE : Cotingidés

POIDS : 210 g à 270 g

TAILLE : 30 cm

PREDATEUR : les rapaces

DUREE DE VIE : 5 à 7 ans

REGIME : Frugivore : Fruits, graines, insectes.

REPARTITION : Pérou, Colombie, Vénézuéla, Bolivie

HABITAT : Forêts d'altitudes proche de cours d'eaux, falaises, éboulis...

COUVEE : 28 jours

PONTE : 2 oeufs

Oiseau national du Pérou, le coq de roche mâle est reconnaissable à sa couleur rouge orangée, sa huppe en forme de casque, ses ailes noires et son dos argenté. Il se différencie ainsi de la femelle, beaucoup plus sobre et entièrement marron. Espèce d'Amérique du sud, le coq de roche péruvien comme son nom l'indique, fréquente les falaises ainsi que les cavernes qu'il recherche pour ses cavités rocheuses.

Le Coq-de-roche péruvien se nourrit principalement de fruits, de grands insectes et de petits vertébrés. Les fruits sont picorés tout en volant. Ce sont des fruits qui proviennent de nombreuses espèces de plantes forestières. Il disperse les graines qu'il a ingurgité, favorisant ainsi le maintien de nombreuses espèces végétales.

La saison de reproduction a lieu entre février et juillet au sud de la Colombie, mais cette période peut varier selon la distribution.

Le nid du Coq-de-roche péruvien est fait essentiellement avec de la boue. Il est en forme de cône tronqué et attaché à la falaise à une hauteur de 3 à 12 mètres sur la roche. Cette coupe est tapissée de fibres végétales grossières. Plusieurs nids peuvent se trouver relativement proches les uns des autres.

La femelle dépose deux œufs et incube pendant 28 jours. Les jeunes quittent le nid au bout de 42 à 48 jours après la naissance.

Les tâches liées à la nidification sont assurées par la femelle seule. Le mâle ne participe pas. Après l'accouplement, la femelle disparaît dans la forêt, elle pond et couve, et élève les poussins seule.

Pendant la période de nidification, les jeunes sont nourris avec des petits lézards et grenouilles. La proie est frappée contre une surface dure, souvent sur la branche, macérée dans le bec de l'adulte avant d'être donnée au poussin la tête la première.

Le Coq-de-roche péruvien n'est pas une espèce menacée. Il a cependant des prédateurs : des rapaces, des mammifères carnivores, ou même des reptiles. En cas de danger, le coq de roche vole avec agilité dans les sous-bois, naviguant avec habileté à travers la végétation grâce à ses larges ailes mues par des muscles puissants.

Le coq de roche péruvien

1. Sur quel continent trouve-t-on le coq de roche péruvien ?

2. A quelle classe d'animaux appartient le coq de roche péruvien ?

les poissons

les oiseaux

les mammifères

3. Quel est son habitat ?

4. De quoi se nourrit-il ?

5. Quelle est la différence entre les coqs de roche mâle et femelle ?

6. De quelle façon, le coq de roche péruvien, favorise-t-il le maintien de nombreuses espèces végétales ?

7. Quels sont ses prédateurs ?

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

taille : _____

durée de vie : _____

poids : _____

famille : _____

couvée : _____

ponte : _____

Le coq de roche péruvien

1. Sur quel continent trouve-t-on le coq de roche péruvien ?

Amérique

2. A quelle classe d'animaux appartient le coq de roche péruvien ?

les poissons

les oiseaux

les mammifères

3. Quel est son habitat ?

Forêts d'altitudes proche de cours d'eaux, falaises, éboulis...

4. De quoi se nourrit-il ?

Il se nourrit principalement de fruits, de grands insectes et de petits vertébrés.

5. Quelle est la différence entre les coqs de roche mâle et femelle ?

Le mâle a une couleur rouge orangée, la femelle est plus sombre ;

6. De quelle façon, le coq de roche péruvien, favorise-t-il le maintien de nombreuses espèces végétales ?

En dispersant les graines qu'il a ingérées.

7. Quels sont ses prédateurs ?

des rapaces, des mammifères carnivores, ou même des reptiles.

8. Complète avec les données trouvées dans le document:

taille : 30 cm

durée de vie : 5 à 7 ans

poids : 210 g à 270 g

famille : Cotingidés

couvée : 28 jours

ponte : 2 œufs